ПОЗДНЕЛЕТНИЙ АСПЕКТ ФАУНЫ ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БЫСТРЫЙ ИСТОК

Копылов М.А.

Горно-Алтайского государственного университета, г. Горно-Алтайск.

Видовой состав фауны дневных чешуекрылых юга Западной Сибири выявлен относительно полно [1; 3; 4]. Однако для более детальной схемы зоогеографического районирования конкретных сведений о местах находок дневных бабочек по-прежнему не достаточно. Последние данные по предгорьям Алтая не ликвидируют этот пробел [2; 5].

Цель сообщения заключается в изложении результатов фаунистических исследований в лесостепной зоне алтайских предгорий. Материалы, послужившие основой для сообщения, собраны с 12 июля по 28 августа 2005 года в окрестностях села Быстрый Исток. Село расположено на территории Северо-Предалтайской физико-географической провинции. Рельеф местности характеризуется холмисто-увалистыми участками высотой не более 500 м над ур. моря. Растительный покров представлен луговыми степями, сочетающимися с березовыми перелесками.

Автор выражает искреннюю признательность к.б.н. П.Ю. Малкову за методологическое руководство и помощь в определении.

HESPERIDAE

Pyrgus alveus (Hubner, 1803), *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808*)*.

PAPILIONIDAE

Papilio machaon Linnaeus, 1758.

PIERIDAE

Leptidea sinapis (Linnaeus 1758), *Leptidea morsei* (Fenton in Butler, 1881), *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758), *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758), *Pieris napi* (Linnaeus, 1758), *Colias hyale* (Linnaeus, 1758).

NYMPHALIDAE

Aglais urticae (Linnaeus, 1756), *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758), *Argynnis adippe* (Linnaeus, 1767), *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758), *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758), *Clossiana dia* (Linnaeus, 1767).

SATYRIDAE

Chazara briseis (Linnaeus, 1764), Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758), Satyrus dryas (Scopoli, 1763), Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788), Coenonympha pamphilis (Linnaeus, 1758), Hyponephele lycaon (Kuhn, 1774), Melanargia russae (Esper, 1784).

LYCAENIDAE

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761), *Heodes tityrus* (Poda, 1761), *Heodes virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Maculinea telejus* (Bergstrasser, 1779), *Everes argiades* (Pallas, 1771), *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758), *Aricia allous* (Hubner, 1819), *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780), *Cupido osiris* (Meigen, 1829), *Plebejus argus (*Linnaeus, 1758), *Plebejus argyrognomon* (Bergstrasser, 1779), *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775), *Plebicula amanda* (Schneider, 1792).

Литература

1. Коршунов Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Урала, Сибири и Дальнего Востока (определитель и аннотации). – Новосибирск, 2000. - 219 с.

2. Малков П.Ю. Фаунистический список Lepidoptera, Diurna предгорно-низкогорной части Северо-Восточного Алтая // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Тез. докл. IV Международной науч. конф. - Томск, 1999. - С. 67.

3. Сергеев М.Г. Районирование фауны прямокрылых и булавоусых чешуекрылых насекомых южных частей Западной и Средней Сибири, а также сопредельного Казахстана // Вопросы экологии. – Новосибирск, 1980. – С. 18-30.

4. Штандель А.Е. О взаимоотношении фаун дневных чешуекрылых Западной и Восточной Сибири // Фауна и экология членистоногих Сибири. – Новосибирск, 1966. – С. 187-190.

5. Korb S. K., Perounov Y. E., Yakovlev R. V. Les Rhopaloceres de Ir Altai planitiare (Lepidoptera, Rhopalocera) // Alexanor, 2000, 21(2).