О ВОЛКО-СОБАЧЬЕМ ГИБРИДЕ НА АЛТАЕ

Часовских С.Н.*, Часовских В.А.**
*Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республики Алтай, г. Горно-Алтайск;
**Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск

Явление гибридизации, происходящее между волком и собакой, представляет большой научный и практический интерес. Известно, что волк – родоначальник собак, что эти звери скрещиваются между собой и что гибридное потомство сохраняет способность к дальнейшему размножению. Признаком появления волко-собачьих гибридов служит обычно наличие в выводке волка особей с нетипичной окраской меха: чаще черной, рыжей, пегой, реже белой [1]. О таких «волках» известно давно, но не всегда их появление связывали с гибридизацией. В 1927 году профессор П.А. Мантейфель в Московском зоопарке экспериментально доказал возможность получения волко-собачьих гибридов. В Алтайском крае описано 12 подобных случаев [2].

Появление волко-собачьих гибридов бывает зачастую связано с сокращением численности волка в регионе или его полным истреблением. Особенно характерно это для центральных степных и лесостепных регионов России, где длительное существование волка в условиях интенсивного преследования невозможно из-за ухудшения защитных качеств угодий и возросшей оснащенности охотников. В тоже время при большом количестве бродячих и одичавших собак создается ситуация когда возможен контакт во время гона собак и волков.

По сведениям отдела охотничьего надзора по Республики Алтай Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республики Алтай для Горного Алтая численность волка и его добыча в целях регулирования остается достаточно высокой в последние 5 лет (см. табл.). Этот случай один из первых известных нам, хотя единичные случаи контактов между волками и собаками отмечались.

По сообщению охотоведа Шебалинского района Республики Алтай В.П. Какпакова в марте 2006 года в районе сельского поселения Беш-Озек появилась волчица. В это время уже шел гон, волчица была одинокой, видимо по причине того, что в районе активно ведется борьба с этим хищником и его численность поддерживается на минимальном уровне. Она вечером подходила к окраине села и начинала выть. В одном из крайних домов жила овчарка (кобель), которая, как и во многих селах республики, содержится без привязи. Кобель уходил к волчице и возвращался только утром. Спустя несколько дней волчица была отстреляна при облавной охоте.

Численности волка на территории Республики Алтай за последние годы

годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (1п.)
численность	1368	1985	2551	1945	1722	2322	1200-1300
добыча	397	681	407	698	335	655	344
в т.ч. самцы	208	323	184	388	147	257	209
самки	112	191	156	199	127	168	70
волчата	77	167	67	111	61	230	65

24 декабря 2005 г. в Онгудайском районе в окрестностях с. Купчегень петлей был отловлен зверь светло-рыжего с серым окраса. По словам местных жителей, группа волков в количестве 4-х особей напала и задрала лошадь. В этой стае два волка выделялись необычным окрасом, вот один из этих «волков» и был отловлен у туши задранного коня. К нам он попал в замороженном виде с хорошо сохранившимся меховым покровом (рис. 1-2). При визуальном осмотре было установлено, что это гибрид волка и собаки.

Рис. 1. Волко-собачий гибрид. Форма головы – собачья.

Рис. 2. Волко-собачий гибрид. Форма хвоста волчья – ”поленом”.

Светло-рыжий окрас нехарактерен для волка, в тоже время при рассмотрении остевого волоса была видна его зонарная окраска – чередование светлого и темного окраса. Зонарная световая комбинация остевого волоса - характерный признак волка. Второй особенностью, подтверждающей, что в данном экземпляре присутствует кровь волка, это строение и размер передней лапы – длина 90 мм, ширина 60 мм, задняя лапа – длина 65 мм, ширина 55 мм. Размещение мозолей на ступательной части лапы характерные для волка (рис. 3). Средние когти на передних лапах темные, крайние светлые, на задних лапах чередуются темные и светлые (у волка когти темные, у собаки светлые). Окрас туловища светло-рыжий с серым, хвост серый с рыжим, уши – серые с рыжим, лапы более светлые. Хвост большой, пушистый, волчьего типа, длина 440 мм (рис. 2). Охотники называют такой хвост «поленом». Голова массивная, похожая на собачью, с крупными белыми зубами, как у волка (рис. 1). Длина черепа 275 мм, ширина 155 мм. Зверь мощный, высота в холке 700 мм, длина от мочки до корня хвоста 1170 мм.

Рис. 3. Особенности размещения мозолей волка (а) и собаки (б).

Для Республики Алтай это первый, зарегистрированный и описанный случай добычи гибрида. Одной из причин его появления, по нашему мнению - беспривязное содержание собак во многих населенных пунктах Республики Алтай. Волко-собачьи гибриды более опасный зверь, нежели волк. Они способны образовывать стаи до 18 особей [3]. Этот хищник бесстрашно приближается к жилищу человека, при случайной встрече его не отстреливают, считая, что это собака. Волко-собачьи гибриды и бродячие собаки чаще, чем волки, являются носителями опасных инфекций, например бешенства, стригущего лишая, чесотки [4]. При значительном уменьшении численности волков возникает возможность замещения экологической ниши волка бродячими и одичалыми собаками, а также появление волко-собачьих гибридов. Борьба с ними может оказаться еще более сложной и трудоемкой, чем с некоторым количеством волков. Эти обстоятельства надо иметь в виду, регулируя численность волков, как компонент системы крупных хищников: волки – бродячие и одичалые собаки – волко-собачьи гибриды (поскольку эта система, в силу сложившихся социально-экономических условий, неизбежно будет иметь место в охотничьих угодьях Алтая).

Литература

1. Павлов М.П. Волк. – Москва: Изд-во «Агропромиздат», 1990. - 350 с.
2. Бондарев А.Я. Волк юга Западной Сибири и Алтая: Монография. - Барнаул: Изд-во Барнаульского гос. пед. ун-та, 2002. - 178 с.
3. Данилкин А.А. Охота волко-собачьих гибридов на косуль. // Охота и охотничье хозяйство. 1979, № 3.
4. Михайлов А.М., Клюкин Н.К. Волки Подмосковья. - М.: Изд-во «Золотой век», 1997. – 192 с.